

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

Lacipil 4 mg compresse rivestite con film

Lacipil 6 mg compresse rivestite con film

lacidipina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe avere bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1.Che cos'è Lacipil e a cosa serve

2.Cosa deve sapere prima di prendere Lacipil

3.Come prendere Lacipil

4.Possibili effetti indesiderati

5.Come conservare Lacipil

6.Contenuto della confezione e altre informazioni

1.Che cos'è Lacipil e a cosa serve

Lacipil è usato per il trattamento della pressione alta del sangue (ipertensione). Appartiene ad una classe di medicinali chiamati "bloccanti dei canali del calcio". Lacipil ha la proprietà di allargare (dilatare) i vasi sanguigni, facilitando il flusso sanguigno e abbassando la pressione.

2.Cosa deve sapere prima di prendere Lacipil

Non prenda Lacipil:

- se è **allergico** al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
 - se lei è affetto da una malattia del cuore chiamata **stenosi aortica**. Questa malattia è un restringimento della valvola che permette al sangue di essere pompato fuori dal cuore
- ➔ se lei pensa che una di queste condizioni la riguardi, **non prenda Lacipil** prima di averne parlato con il suo medico.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere Lacipil.

Prima del trattamento con Lacipil il suo medico deve sapere:

- se lei ha **problemi di cuore**
- se lei ha **malattie del fegato**.

Altri medicinali e Lacipil

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Alcuni medicinali possono alterare l'attività di Lacipil, o aumentarla provocando effetti collaterali. Lacipil può anche alterare l'attività di altri medicinali, tra cui:

- altri medicinali utilizzati per il trattamento della **pressione alta del sangue** come furosemide, propranololo o captopril
- cimetidina (per il trattamento di **ulcere allo stomaco**)
- ciclosporina (usata per la prevenzione del rigetto nel trapianto di organi o per alcune malattie autoimmuni).

L'uso concomitante di lacidipina e corticosteroidi o tetracosactide può diminuire l'effetto antiipertensivo.

➔ **Parli con il medico o il farmacista** se sta prendendo uno di questi medicinali.

Assunzione di Lacipil con cibi e bevande

Non beva succo di pompelmo mentre sta prendendo Lacipil.

Gravidanza e allattamento

Chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Non ci sono informazioni sulla sicurezza di impiego di Lacipil in gravidanza. Se lei è **gravida** o **pensa di esserlo**, o se **sta pianificando una gravidanza non prenda Lacipil** senza prima avere verificato con il suo medico. **Il suo medico** prenderà in considerazione rischi e benefici legati all'assunzione di Lacipil per lei e per il suo bambino.

Il principio attivo e gli altri componenti di Lacipil possono passare nel latte materno. **Se lei sta allattando, verifichi col suo medico** prima di iniziare la terapia con Lacipil.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Lacipil può causare vertigini. I pazienti dovrebbero essere allertati a non guidare o non usare macchinari se soggetti a vertigini o sintomi associati.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Lacipil

Lacipil contiene lattosio: se il medico le ha diagnosticato un'intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

3. Come prendere Lacipil

Quanto prenderne

Prenda Lacipil sempre seguendo esattamente le istruzioni del medico. Se ha dubbi, consulti il medico o il farmacista. Verifichi con il suo medico o con il suo farmacista se non è sicuro.

La dose usuale di partenza di Lacipil è di 2 mg una volta al giorno, la mattina.

Il suo medico può decidere se aumentare la dose a 4 o 6 mg, una volta al giorno la mattina dopo circa 3-4 settimane di terapia.

Come prenderlo

Deglutire la compressa con un po' di acqua.

È preferibile prendere la medicina ogni giorno alla stessa ora.

Può prendere Lacipil con o senza cibo.

Se prende più Lacipil di quanto deve

Se prende troppe compresse di Lacipil, è **molto probabile un abbassamento della pressione del sangue e un cambiamento del battito cardiaco, che può aumentare o diminuire.**

➔ **Si rivolga al medico o al farmacista per un consiglio.**

Se dimentica di prendere Lacipil

Se dimentica di prendere una dose, prenda la successiva alla stessa ora. **Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della compressa.**

Se interrompe il trattamento con Lacipil

Prenda Lacipil per il tempo raccomandato dal suo medico. Non interrompa l'assunzione di Lacipil senza il consiglio del medico.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di Lacipil, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati comuni

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 10**:

- battiti irregolari del cuore (palpitazioni)
- battiti più veloci del cuore (tachicardia)
- gonfiore causato dai fluidi
- vertigini
- urinare di frequente
- cefalea
- rash cutanei (incluso arrossamento della pelle e prurito)
- vampate
- disturbi gastrici
- nausea
- stanchezza

Effetti indesiderati comuni che possono essere riscontrati con l'analisi del sangue:

- aumento reversibile del livello di un enzima chiamato fosfatasi alcalina

Effetti indesiderati non comuni

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 100**:

- peggioramento del dolore toracico (peggioramento di pre-esistente angina pectoris)
- pallore
- abbassamento della pressione sanguigna
- emorragie, gengive dolenti
- sincope
- ipotensione

Effetti indesiderati rari

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 1.000**:

- gravi reazioni allergiche con gonfiore del viso, lingua o gola che può causare difficoltà nella deglutizione o respirazione
- eritema pruriginoso nella pelle

Effetti indesiderati molto rari

Questi possono riguardare **fino a 1 persona su 10.000**:

- agitazione o tremore delle braccia e delle gambe
- depressione

Se avete uno di questi effetti indesiderati

➔ Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati **peggiora**, o se nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, **informi il medico o il farmacista**.

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo: <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>.

Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare Lacipil

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo SCAD. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Conservare a temperatura non superiore a 30°C.

Conservare nel contenitore originale per proteggere dalla luce.

Nel caso di assunzione di metà di una compressa da 4 mg, la rimanente metà deve essere riposta nel blister e reinserita nell'astuccio per proteggerla dalla luce e deve essere assunta ENTRO 48 ore.

Non estrarre la compressa dal blister fino a quando non la deve prendere.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Lacipil

Il principio attivo è lacidipina. Lacipil compresse è presente in diversi dosaggi.

Ogni compressa contiene:

4 mg di lacidipina

6 mg di lacidipina

Gli altri componenti sono:

Lattosio monoidrato, povidone K30, magnesio stearato. Rivestimento: Opadry White YS-1-18043 (ipromellosa, titanio diossido (E171), polietilenglicole (PEG) 400, Polisorbato 80) o Opadry White OY-S-7335 (ipromellosa, biossido di titanio (E171)).

Descrizione dell'aspetto di Lacipil e contenuto della confezione

Lacipil 4 mg compresse è di colore bianco, di forma ovale con linea di frattura su entrambi i lati e con inciso "GS" su un lato e "3MS" sull'altro lato.

Confezione da 28 compresse.

Lacipil 6 mg compresse è di colore bianco, di forma ovale con inciso "GXCX3" su un lato. Confezione da 14 compresse.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio nel paese di origine e Produttore

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio nel paese di origine

GlaxoSmithKline Trading Services Limited

12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24 YK11, Irlanda.

Produttore

Glaxo Wellcome S.A.

Avenida de Extremadura 3 - 09400 Aranda de Duero, Burgos - Spagna

Delpharm Poznan S.A.

ul. Grunwaldzka 189 - 60-322 Poznań, Polonia

Importatore parallelo in Italia

Farmed S.r.l.

Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli - Italia

Riconfezionato nell'officina indicata dall'ultima lettera accanto al numero di lotto:

® De Salute S.r.l. - Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR) - Italia

© S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO) - Italia

© GXO Logistics Pharma ITALY S.p.A. - Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI) - Italia

© Columbus Pharma S.r.l. - Via dell'Artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI) - Italia

® Medezin Sp. z o. o. - Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Łódzki, 95-050 - Polonia

© Prespack Sp. z o. o. - Grzybowa 8C - 62-081 Wysogotowo - Polonia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 11/2020

Marchi di proprietà di società del gruppo GSK o di licenzianti

©2020 Società del gruppo GSK o licenziante