

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso; contengono importanti informazioni su come usare il prodotto. Per eventuali domande si rivolga al suo farmacista, al suo medico, o direttamente a noi.

BAUSCH + LOMB

Artelac[®] Nighttime Gel

2 mg/g di carbomer e trigliceridi a catena media

Indicazioni d'uso: Artelac[®] Nighttime Gel è un lubrificante oculare.

Che cos'è Artelac[®] Nighttime Gel?

Artelac[®] Nighttime Gel è un gel oftalmico. 1 g contiene 2 mg di carbomer e trigliceridi a catena media. Contiene inoltre: acqua sterile, sorbitolo ed idrossido di sodio.

Contiene cetrimide come conservante.

Una volta aperto può essere utilizzato per 6 settimane.

Perché usare Artelac[®] Nighttime Gel?

Artelac[®] Nighttime Gel è un lubrificante oculare ad elevata viscosità per offrire un'idratazione e protezione prolungata della superficie oculare in presenza di una sensazione di occhio secco.

Artelac[®] Nighttime Gel, subito dopo l'applicazione, provocherà inizialmente un appannamento della vista, prima che il gel venga distribuito sbattendo ripetutamente le palpebre; per questo motivo, molte persone scelgono di usare il prodotto durante la notte.

Quando utilizzare Artelac[®] Nighttime Gel:

Artelac[®] Nighttime Gel è stato formulato per fornire supporto al film lacrimale, incluso l'importante strato lipidico esterno, per offrire il massimo sollievo e mantenere a lungo l'idratazione sulla superficie oculare.

Ha un effetto calmante e lenitivo sugli occhi, e al contempo mantiene l'idratazione per dare un sollievo prolungato.

Il prodotto è ideale per tutti coloro che soffrono dei vari sintomi di secchezza oculare come stanchezza, stress, sensazione di corpo estraneo, bruciore e/o lacrimazione. Anche coloro che usano altri prodotti per secchezza oculare possono trarre beneficio da Artelac[®] Nighttime gel utilizzando in aggiunta al prodotto usato abitualmente, per un'extra protezione.

L'occhio secco può essere causato da:



fattori esterni, come uso prolungato del computer, aria condizionata o riscaldamento, fumo di sigaretta, così come ambienti ventosi oppure l'uso di lenti a contatto;

altri fattori, quali l'uso di alcuni farmaci (come contraccettivi, antistaminici, betabloccanti, antispastici e diuretici) o alcune malattie che giocano un ruolo importante nello sviluppo della secchezza oculare.

Con che frequenza utilizzare Artelac[®] Nighttime Gel?

Instillare una goccia di Artelac[®] Nighttime Gel nell'occhio 15 minuti prima di andare a letto se si predilige l'uso durante la notte oppure instillare da 3 a 5 gocce di gel o più durante il giorno.

Come usare Artelac[®] Nighttime Gel:

	1. Rimuovere il cappuccio protettivo dall'estremità del tubo prima di ogni utilizzo.
	2. Reclinare la testa leggermente all'indietro e tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore con un dito della mano libera, tenere il tubo in posizione verticale sull'occhio. Premere delicatamente il tubo per instillare una goccia di gel nell'occhio.
	3. Richiudere il prodotto dopo ogni utilizzo. Chiudere l'occhio ed effettuare lenti movimenti rotatori, sbattendo le palpebre per consentire una distribuzione ottimale delle gocce di gel sulla superficie oculare.

Quando non usare Artelac[®] Nighttime Gel?

Non usare il prodotto in caso di ipersensibilità ad uno degli ingredienti.

Informazioni importanti sull'uso di Artelac[®] Nighttime Gel

- In rari casi, questo prodotto può causare reazioni di ipersensibilità. In questi casi, interrompere il trattamento
- Questo prodotto può causare temporaneo offuscamento della visione dopo l'instillazione, che può avere un impatto negativo sulla guida di veicoli o uso di macchinari.
- Non toccare la superficie oculare con la punta del tubo per evitare qualsiasi possibile ferita.
- Rimuovere le lenti a contatto prima dell'uso.
- Nel caso in cui si utilizzino altri prodotti per gli occhi o prima di reindossare le lenti a contatto, attendere circa 15 minuti.
- Non toccare la superficie oculare con la punta del tubo o con le dita per evitare ogni possibile contaminazione del prodotto.
- Non usare dopo la data di scadenza.
- Non usare se la confezione o il tubo sono danneggiati.

Come conservare Artelac® Nighttime Gel?

Conservare ad una temperatura massima di 25 °C.

Una volta aperto, il prodotto può essere utilizzato per 6 settimane.

Confezioni:

Artelac® Nighttime Gel è disponibile in tubo da 10 g.

	Sterilizzato usando la tecnica in asepsi
	Limite superiore di temperatura
	Eliminare il dispositivo medico dopo di sei settimane dalla prima apertura del contenitore
	Non usare se il confezionamento è danneggiato
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Data di scadenza
	Numero di Lotto
	Data di fabbricazione
	Fabbricante: Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173 13581 Berlino (Germania)

Distributore parallelo:

Farmed S.r.l. - Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli - Italia

Riconfezionato nell'officina:

GXO Logistics Pharma ITALY S.p.A.

Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI)

 0483

Artelac® Nighttime Gel: 2016-11-21

®/™ sono marchi registrati di Bausch & Lomb Incorporated o di sue affiliate

© Bausch & Lomb Incorporated